Jak zmierzyć średnie narażenie na pył?

Kategoria: Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego
Opublikowano: czwartek, 12, lipiec 2012 17:49
Grzegorz P. Kubalski
Odsłony: 1764

Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego – w ślad za regulacjami europejskimi – obowiązku monitorowania stężenia pyłu PM2,5 pociąga za sobą konieczność ustalenia zasad pomiaru stężenia tego pyłu w poszczególnych aglomeracjach i miastach. Nastąpi to na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu obliczania wskaźników średniego narażenia oraz sposobu oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji, którego projekt został skierowany do zaopiniowania przez Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska.

Zgodnie z projektem rozporządzenia:

- wskaźnik średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji wyznacza się jako trzyletnią średnią kroczącą ze średnich rocznych stężeń pyłu PM 2,5;
- krajowy wskaźnik średniego narażenia wyznacza się jako średnią arytmetyczną ze średnich rocznych stężeń pyłu PM2,5 w ciągu poprzednich trzech lat dla wyznaczonych stanowisk pomiarowych tła miejskiego.

Do oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji w danym obszarze stosuje się trzyletnią średnią kroczącą wskaźnika średniego narażenia w danym obszarze, obliczaną z trzech lat poprzedzających rok wykonania oceny.

Phoca PDF