

Nadużywanie antybiotyków u pacjentów z COVID-19

Kategoria: Polityka Zdrowotna

Opublikowano: piątek, 26, kwiecień 2024 12:42

Patrycja Grebla-Tarasek

Odsłony: 196

Nowe dowody Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują na powszechne nadużywanie antybiotyków podczas pandemii Covid-19 na całym świecie, co mogło zaostriżyć „ciche” rozprzestrzenianie się oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR).

Chociaż tylko 8% hospitalizowanych pacjentów z Covid-19 miało infekcje bakteryjną wymagającą antybiotyków, trzech na czterech, czyli około 75% pacjentów, zostało leczonych antybiotykami „na wszelki wypadek”, które okazały się pomocne.

Najwyższy wskaźnik stosowania antybiotyków zaobserwowano wśród pacjentów z ciężkim lub krytycznym przebiegiem Covid-19 – średnia światowa wyniosła 81%. W przypadkach łagodnych i umiarkowanych występowały znaczne różnice między regionami, przy czym najwyższe wykorzystanie odnotowano w regionie Afryki (79%).

Stosowanie antybiotyków nie poprawiło wyników klinicznych u pacjentów z Covid-19. Może jednak raczej zaszkodzić osobom bez infekcji bakteryjnej w porównaniu z osobami nieotrzymującymi antybiotyków. Podkreśla to pilną potrzebę poprawy racjonalnego stosowania antybiotyków, aby zminimalizować niepotrzebne negatywne konsekwencje zarówno dla pacjentów, jak i populacji.

Źródło: [WHO](#)